

含Ibuprofen成分口服劑型指示藥品仿單修訂

(加框刊載於仿單起始處)

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。

【使用上注意事項】(加刊)

- 有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
 2. 目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。
 3. 嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)。
 4. 嚴重肝衰竭。
 5. 嚴重腎衰竭。
 6. 服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人。
 7. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 未滿12歲，65歲以上。
 2. 孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。
 3. 曾有消化性潰瘍的人。
 4. 有凝血功能異常或曾有相關病史的人。
 5. 有肝臟疾病或曾有相關病史的人。
 6. 有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人。
 7. 曾有藥物過敏的人。
 8. 支氣管氣喘的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 正在使用任何藥品。
 2. 高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。
 3. 時常飲用酒精性飲料的人。

● 其他使用上注意事項：

1. 服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
2. 勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考。
3. 本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用。
4. 若經醫師處方長期使用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
5. 酒精警語：不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血。

【警語】

一、服用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

皮膚	皮膚癢、起疹子
消化系統	胃部(肚臍上方)不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子
精神及神經系統	抑鬱
其他	頭痛、頭暈

二、使用本藥後，若發生下列副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治。

1. 已使用本藥用來退燒超過3天或用來止痛超過5天，症狀未緩解或更惡化時。
2. 有下列症狀：

身體部位	副作用
血液	再生不良性貧血(可能症狀:出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫)、顆粒性白血球缺乏(可能症狀:容易感染、發燒、寒顫)、血小板減少(可能症狀:出血、傷口出血不止)
過敏症	史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(可能症狀:皮膚紅疹、搔癢或水泡;口腔潰瘍;喉嚨痛;眼睛紅腫、灼熱;臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹;發燒)、氣喘(可能症狀:呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難)。
眼睛	視覺異常
耳朵	重聽、耳鳴
肝臟	黃疸(眼白變黃)、肝功能指數 GOT/GPT(AST/ALT)異常
消化系統	胃痛或有灼熱感、血便

口腔	口內炎（口腔潰瘍或發炎）
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫（可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫）、心肌梗塞（可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢）、低血壓（可能症狀：暈厥）
其他	體溫過度下降、四肢冰冷