

含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)口服劑型指示藥品中文仿單修訂

指示藥品成分	修正後文字	原文字
Ginkgo biloba extract	<p>一、【使用上注意事項】欄位：</p> <p>(一)「有下列情形者，請勿使用」新增</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 懷孕。 2. 近期將進行手術：因可能增加手術出血之風險。 <p>(二)「有下列情形者，使用前請洽醫師診治」新增：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 癲癇病人：建議避免使用本藥，因本藥可能會誘發癲癇的發作。 2. 正在使用抗凝血劑、抗血小板藥品、非類固醇類抗發炎止痛劑：可能因藥物交互作用而發生不良反應之風險。 <p>(三)「有下列情形者，使用前請先諮詢醫師或藥師、藥劑生」，新增「正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品」。</p> <p>(四)「其他使用上注意事項」新增「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥，並在手術前七天停止使用」。</p>	<p>一、於「禁忌」欄位加刊：「懷孕」。</p> <p>二、於「警語及注意事項」欄位加刊：</p> <p>(一)「手術出血風險」：「如果必須進行手術，請務必告訴醫師正在服用本藥品，並在手術前七天停止使用」。</p> <p>(二)「不良反應」：「依據案例報告、臨床研究及上市後資料顯示，使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)之藥品，可能發生以下不良事件，包含器官(如眼睛、鼻子、大腦和胃腸道)出血、頭痛、頭暈、輕微的胃腸道不適(如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐)及過敏性皮膚反應(如紅斑、皮疹、水腫、瘙癢)，嚴重者甚至可能發生過敏性休克」。</p> <p>(三)於「特殊族群」欄位加刊：「癲癇病人：建議癲癇病人避免使用含銀杏葉抽出物成分(Ginkgo biloba extract)及已知會降低癲癇發作閾值之藥品。癲癇病人服用銀杏製</p>

二、【警語】欄位：

(一)「服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治」新增：

1. 使用本藥可能出現輕微的胃腸道不適(如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐)，亦可能出現嚴重之不良反應。
2. 器官出血(如眼睛、鼻子)、腦出血(如劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差)、胃腸道出血(如吐血、黑便、血便)。
3. 過敏性皮膚反應(如紅斑、皮疹、水腫、搔癢)。

劑產品，無法排除該品會促使其下一次癲癇的發作。

(四)於「藥品交互作用」欄位統一為：

1. Ginkgo biloba 與抗凝血劑(如 phenprocoumon 或 warfarin)或抗血小板藥品(如 clopidogrel、acetylsalicylic acid 及 NSAIDs 等)併用可能會影響抗凝血劑或抗血小板藥品之作用。
2. Ginkgo biloba 與 warfarin 合併使用時，建議應於開始合併使用、改變劑量、停止或更換使用銀杏製劑時，進行凝血功能監測。
3. Ginkgo biloba 可能具有抑制 P-glycoprotein 作用，而因此增加 P-gp 受質藥品(如 dabigatran)之暴露，建議合併 ginkgo biloba 與 P-gp 受質藥品時應謹慎使用。